


Published on *Urząd Miejski w Świeciu* (<https://archiwum.swiecie.eu>)

Strona główna > Główny Inspektor Sanitarny...

Główny Inspektor Sanitarny...

02 stycznia 2013



[1]

OSTRZEGA

przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml ($\frac{1}{2}$ kieliszka do wódki) **alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy**

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) **alkoholu metylowego to dawka śmiertelna**

Gdzie najczęściej występuje metanol:

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
- w płynach do spryskiwaczy
- w denaturacie
- w odmrażaczach do szyb
- w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

- pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
- następnie pojawiają się:
 - bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty,
 - silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca,
 - senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego).

Pierwsza pomoc:

- wezwać pogotowie ratunkowe
- jeśli zatruty jest przytomny:

- wywołać u niego wymioty,
- podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki),
- jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc:

TEL: 999, 997 lub 112

Adres źródłowy: <https://archiwum.swiecie.eu/pl/news/g%C5%82%C3%B3wny-inspektor-sanitarny>

Links

[1] <https://archiwum.swiecie.eu/sites/default/files/field/image/metanol3.JPG>